

| číslo | věk | pohlaví | očkování | N.Ú | Covid 19 | kortikoidy | efekt | dlouhodobý efekt |
|-------|-----|---------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|
| 1 | 83 | ž | Pfizer 2.d: 17.2.21 | totální blokáda hybnosti očkovaného ramene, více než 3 měsíce, pak zlepšena po kortikoidech, vznik ihned po vak. | ne | ano | 50% | 20% |
| 2 | 74 | M | Pfizer 2.d: 05/21 | Tinitus sin, hučení celé hlavy, vznik 14 dní po druhé dávce | ne | ano | 90% | 90% |
| 3 | 74 | ž | Pfizer 2.d: 03/21 | Tinitus bill., charakter pískání, od 08/21 | ne | ano | 40% | 40% |
| 4 | 74 | ž | Pfizer 2.d: 05/21 | Tinitus, vznik 14 dní po 2.dávce, vjemy komplexní, sluchové pseudohalucinace, komplexní sluchové vjemy šumění, písní, opery, následně likvor, psychiatr, suicidální tendence | ne | ano | 50% | 0% |
| 5 | 21 | ž | Pfizer 2.d: 1.8.21 | 9.8.21 tinitus, po léčbě 100% úprava | ne | ano | 100% od 11.dne | 100% |
| 6 | 55 | ž | Pfizer 2.d: 06/21 | tinitus bill od 08/21 | ano 01/21 | ano | 20% | 0% |
| 7 | 73 | ž | Pfizer 2.d: 04/21 | Bezprostředně po druhé dávce zhoršení neuropatických bolestí v LDK a kyčli | ne | ne | | |
| 8 | 75 | ž | Moderna 1.d: 03/21 2.d: 9.4.21 | Po 1.dávce -nachlazení, bolest v krku, kašel, zhoršení vidění. Po 2. dávce porucha vidění, bolesti krku, hrudníku, svalů, kloubů, únava, slabost, teploty 38°C. | ne | ano | 50% | 50% |
| 9 | 73 | ž | Pfizer 1.d: 04/21 2.d: 05/21 | PO 1.dávce slabost, únava, apatie, bolesti nohou. Došlo k odkladu 2.dávky, po druhé dávce bez obtíží. | ne | ne | | |
| 10 | 34 | ž | Pfizer 2.d: 03/21 | Recidivující těžký herpes obličeje opakovaně 03-06/21, léčba herpesin, Isorpinosine | ne | ne | | |
| 11 | 73 | ž | Pfizer 2.d: 04/21 | 07/21 těžký herpes zoster drm. S1 vlevo, nutnost hospitalizace | ne | ne | | |
| 12 | 77 | M | Pfizer 2.d: 04/21 | 05-06/21 herpes zoster v LS oblasti | ne | | | |
| 13 | 61 | ž | Pfizer 2.d: 04/21 | 05/21 herpes zoster v bederní oblasti, zhoršení bolesti zad a neuropatických bolestí | ne | | | |
| 14 | 24 | M | Astra Zeneca | Po I.očkování výrazná slabost, únava, spavost, bolesti hlavy a febrilie v trvání 3 týdnů. Dále silná bolest ramene trvající více než 3 týdny. Dále dekompenzace epilepsie, po ročním období bez záchvatů se objevily 2 epileptické záchvaty charakteru GM. | ne | | | |
| 15 | 41 | M | Pfizer 2.d: 04/21 | 1.dávka očkování - silná únava, spánek i vsedě, trvání až 4 dny . 2.dávka - bolest ramene znemožňující jakýkoli pohyb rukou 3 dny, únava silná, od 5. dne tyto obtíže vymizely, ale měsíc přetrvával čichový vjem spálené cigarety | ano v 01/21, středně těžký | | | |
| 16 | 46 | M | Pfizer 1.d: 15.5.21 2.d: 26.6.21 | Po druhé dávce 4 dny slabost, zpomalené psychomotorické tempo, další 4 týdny pak zpomalení myšlení, zhoršení paměti, dosud není stran paměti na tom tak, jak býval - v 09/21 | ano 12/2020 | | | |
| 17 | 84 | ž | Pfizer 29.1.21 | Pár hodin po očkování febrilie, kvadruparesan, trombocytopenie, celková alterace stavu, plicní a uroinfekt, během 8 týdnů exitus. Pozn. 4 týdny před očkováním měla Covid 19 dcera, se kterou žile v jedné domácnosti | ne, 4 týdny před očkováním nemocná dcera | | | |
| 18 | 45 | M | Pfizer 1.d: 12.4.21 2.d: 24.5.21 | 19.6.21 GM epileptický parox, zjištěn glioblastom mozku, v rodinné anamneze tu mozku u matky | ano v 01/21, jen ztráta čichu | ano pro otok mozku | | |
| 19 | 75 | ž | Pfizer 2.d: 03/21 | Zhoršení epilepsie, nástup demence, ležící | ne | | | |
| 20 | 72 | M | Pfizer 2.d: 03/21 | Po 1.dávce bolest ramene. Po 2.dávce za 48 hodin bolest ramene, po jeho krátké masáži pád na zem, v.s. IM či plicní embolie, na místě exitus. | ne | | | |